

# 平成 25 年 細菌性赤痢発生状況

平成 25 年 5 月 21 日現在

NO	性別	年齢	所在地	発症日	診断日	菌類
1	男性	40 歳代	水戸保健所管内	4 月 16 日	4 月 22 日	フレキシネル菌(B群)
2	男性	60 歳代	水戸保健所管内	4 月 17 日	5 月 9 日	ソフネ菌(D群)
3	男性	50 歳代	竜ヶ崎保健所管内	5 月 5 日	5 月 20 日	フレキシネル菌(B群)

## <細菌性赤痢の年次発生届出状況>

年	H20	H21	H22	H23	H24	H25
本県	7	4	5	5	5	3

※平成 25 年の届出数は、今回の発生数を含む。

※平成 25 年の全国の細菌性赤痢の発生届出数（5 月 12 日現在）は、43 人です。

## <細菌性赤痢の特徴>

- ・ 潜伏期間 1～5 日間（通常 3 日以内）
- ・ 主な症状 血便、下痢、腹痛、しぶり腹、発熱（1～2 日）
- ・ 感染経路 経口感染（水や食べ物を通じて「口」から感染する）  
接触感染

## <渡航先での予防策>

- ・ 生水・氷入りジュース・水割り等の飲料に注意する。
- ・ 生野菜、生の魚介類、カットフルーツ、アイスクリーム等の飲食に注意する。
- ・ 調理後時間の経った食物は食べない。
- ・ 手洗いの励行や体調管理に気をつける。

感染症流行情報については、茨城県保健予防課のホームページ

<http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/yobo.htm> をご覧ください。