

第10表 主な死因の死亡率(人口10万対)の年次推移

死因	年次	昭和										平成					
		26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	3	7	11	13	14	15
悪性 新生物	茨城県	85.6	91.3	98.8	112.1	114.8	126.9	120.7	132.1	141.8	157.8	169.0	197.1	219.4	230.0	235.0	243.6
	全国	78.5	87.1	98.2	105.5	113.0	117.7	122.6	135.7	148.3	164.2	181.7	211.6	231.6	238.8	241.7	245.4
心疾患	茨城県	79.4	71.0	81.8	86.1	90.7	95.9	98.5	101.2	117.9	111.9	131.1	114.0	123.6	121.3	130.2	137.3
	全国	63.6	60.9	67.7	70.4	75.7	85.0	89.2	96.9	111.3	118.4	137.2	112.0	120.4	117.8	121.0	126.5
脳血管 疾患	茨城県	171.6	176.0	197.4	220.8	222.8	219.1	203.8	170.3	145.3	120.1	105.7	130.3	126.7	120.6	121.1	121.1
	全国	125.2	136.1	153.7	171.4	173.1	169.6	156.7	137.7	122.8	101.7	96.2	117.9	110.8	104.7	103.4	104.7
肺炎 <sup>1</sup>	茨城県	94.6	58.0	53.8	1.0	33.3	32.4	38.7	27.9	34.6	40.9	56.1	57.6	71.5	63.7	66.7	76.4
	全国	82.2	48.3	45.2	33.2	28.7	28.4	33.7	28.5	37.8	44.8	62.0	64.1	74.9	67.8	69.4	75.3
不慮の 事故 <sup>2</sup>	茨城県	28.8	28.1	34.6	37.2	42.0	54.3	40.0	32.6	29.7	28.9	34.0	39.8	37.8	36.0	37.2	36.1
	全国	37.8	37.3	44.8	41.3	41.9	40.7	30.3	25.3	25.0	23.2	26.9	36.5	32.0	31.4	30.7	30.7
自殺	茨城県	14.0	17.1	15.1	14.0	10.3	13.0	16.0	15.9	19.2	18.6	14.7	17.0	23.5	23.1	24.4	25.3
	全国	18.2	25.2	22.7	16.1	14.2	15.6	18.0	18.0	21.0	19.6	16.1	17.2	25.0	23.3	23.8	25.5
腎不全 <sup>3</sup>	茨城県	38.2	30.6	23.3	16.8	12.5	8.4	6.8	7.7	8.5	9.3	11.2	12.6	13.4	13.0	13.5	14.8
	全国	29.2	21.4	17.7	13.1	9.9	8.2	6.3	8.0	10.3	11.8	13.8	13.0	14.1	14.0	14.4	14.9
結核	茨城県	75.0	36.2	23.0	17.1	11.7	8.0	5.6	4.2	2.8	2.5	1.8	1.9	1.7	1.0	1.5	1.1
	全国	110.3	52.3	35.5	24.2	17.8	13.0	9.5	5.8	4.5	3.3	2.7	2.6	2.3	2.0	1.8	1.9

注:1)死因分類は、ICD-10によるもので、平成6年以前はICD-9による

2)ICD-9による死因: 1肺炎及び気管支炎、 2不慮の事故及び有害作用、 3腎炎、ネフローゼ及びネフローゼ症候群