

落花生の生育状況（6月27日現在、水戸市）

県名	生育ステージ		生育の状況	問題点	今後の栽培管理等
	本年	平年対比			
茨城県 (水戸市)	開花期 6月25日	開花期までの日数 40日 平年並 (平年 -1日)	◇気象概況 生育期間（5月3半旬～6月5半旬）の平均気温は平年よりかなり高く（平年差+0.6℃）、日照時間は平年よりかなり少なく（平年比83%）、降水量については平年並（平年比103%）であった。なお、平年値は水戸地方気象台観測値直近5年間の平均値。 ◇生育概況 播種は平年より1日遅い5月16日に実施した。出芽日数は10日で、平年並（平年+1日）。開花始は6月24日（平年+2日）、開花期は6月25日で（平年±0日）、播種から開花期までの日数は40日と平年並だった。 主茎長及び最長分枝長はかなり長い。主茎節数は少なく、分枝数はやや多い。地上部生体重は軽かった。	—	◇病害虫防除 白絹病などの病害虫について、発生に注意し適期防除を行う。

表1 落花生の生育状況（令和7年6月27日調査）

品種	播種期			出芽期			開花始			開花期			開花までの日数		
	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差
	(月/日)	(日)	(日)	(月/日)	(日)	(日)	(月/日)	(日)	(日)	(月/日)	(日)	(日)	(日)	(日)	(日)
ナカテ	5/16	-1	+1	5/26	+2	+1	6/24	+3	+2	6/25	0	0	40	+1	-1
ユタカ		(5/17)	(5/15)		(5/24)	(5/25)		(6/21)	(6/22)		(6/25)	(6/25)		(39)	(41)

品種	主茎長			最長分枝長			主茎節数			分枝数			地上部生体重		
	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比	本年	前年比	平年比
	(cm)	(%)	(%)	(cm)	(%)	(%)	(節/株)	(%)	(%)	(本/株)	(%)	(%)	(g/株)	(%)	(%)
ナカテ	12.5	136	124	13.8	126	123	10.7	96	92	10.5	100	110	46.3	96	84
ユタカ		(9.2)	(10.1)		(10.9)	(11.2)		(11.1)	(11.6)		(10.4)	(9.7)		(48.2)	(55.0)

注：1. 平年値は直近5カ年（令和2年～令和6年）の平均値




2. マルチ栽培、栽植密度6.9株/㎡（平均畦間60cm×株間24cm）

3. 前年差、平年差の月/日及び日数は実数値で示し、平年より遅い場合は+、早い場合は-で示す。前年比、平年比の主茎長等の項目は%で示す。

4. () 内は前年または平年の実数値を示す。




農研所内圃場における
ナカテユタカの生育状況
(6月27日撮影)
マルチ除去：6月13日
中耕培土：6月24日



気象と生育の平年値との比較表現について

天候や生育の測定値の平年値との違いの程度を、平年に比べて「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」という解説用階級区分で表しています。各階級の幅は、統計期間における出現率が等分（それぞれ33%）となるように決めています。さらに、「低い（少ない）」「高い（多い）」の各33%のうち両端からの各10%を補足的表現としてそれぞれ「かなり低い（かなり少ない）」、「かなり高い（かなり多い）」と表しています。



中心からの偏差

平均が0分散 が1の標準 偏差	%	表現	確率分布の面積	
	0.995	かなり多い	中心から16.5%+20%以上	33%多い
1.10306	0.865	多い	中心から16.5%+20%まで	
0.72248	0.765	やや多い	中心から16.5%+10%まで	
0.42615	0.665	平年並	中心から16.5%まで	33%同等
0	0.5	平年並		
-0.42615	0.335	平年並	中心から16.5%まで	
-0.72248	0.235	やや少ない	中心から16.5%+10%まで	33%少ない
-1.10306	0.135	少ない	中心から16.5%+20%まで	
	0.005	かなり少ない	中心から16.5%+20%以下	