

農 研 速 報

平成 30 年 7 月 11 日発行

茨城県農業総合センター 農業研究所水田利用研究室

〒301-0816 茨城県龍ヶ崎市大徳町 3974

TEL 0297-62-0206 FAX 0297-64-0667

水稲の生育状況(7月9日現在、龍ヶ崎市)

地域名	移植時期	生育ステージ	対平年遅速	生育概況及び今後の栽培管理	備考
茨城県 (龍ヶ崎市)	4 月 26 日	「あきたこまち」 出穂期 「コシヒカリ」 幼穂形成期 「ふくまる」 穂ばらみ期	「あきたこまち」 3 日早い (出穂期) 「コシヒカリ」 3 日遅い (幼穂長からの 出穂期の予測) 「ふくまる」 3 日早い (幼穂長からの 出穂期の予測)	<p>◇4 月第 6 半旬～7 月第 1 半旬は、平均気温が平年よりやや高く(+0.6℃)、日照時間は平年並(104%)で推移した。 「あきたこまち」は、出穂期が 7 月 8 日で平年より 3 日早い。 7 月 5 日時点の幼穂長は、「コシヒカリ」で 5.1mm、「ふくまる」で 173.6mm であった。 幼穂長から予測される出穂期は、「コシヒカリ」で平年より 3 日遅い 7 月 25 日頃、「ふくまる」で平年より 3 日早い 7 月 12 日頃である(今後気温が平年並に推移した場合)。 各品種の生育について、草丈は「コシヒカリ」で平年よりやや長く、茎数は「コシヒカリ」でやや少ない。また、葉色は「あきたこまち」で極淡く、「コシヒカリ」、「ふくまる」で淡い。その他は平年並である。</p> <p>◆今後の栽培管理</p> <p>(1)出穂期までは各品種とも 3～4 日間隔で入水と自然落水を繰り返す間断かんがいを行う。出穂期以降、落水時期までは、2～3 日で水がなくなる程度に入水し、自然落水後、田面が乾く前に入水する作業を継続する。 なお、登熟期の早期落水は乳白粒や胴割粒などを発生させるため注意する。落水時期の目安は、「あきたこまち」が出穂期後 25 日、「コシヒカリ」が出穂期後 30 日である。</p> <p>(2)斑点米カメムシ類の成虫を対象とした防除適期は穂前期である。 また、幼虫を対象とした防除適期は乳熟期(出穂期後10～15日頃)である。斑点米の発生を防止するためには、特に幼虫防除が重要である。</p> <p>(3)紋枯病は、玄米千粒重の低下や乳白粒の発生を引き起こす要因となる。昨年度に発生が多かった圃場では特に注意し、発生を認めた場合には早期に防除を行う。</p>	<p>●いもち病に注意 気温 20～25℃で、弱い雨や霧などが続いてイネの葉が長時間濡れるような条件のとき発生しやすいので注意する。 いもち病の発生する圃場では、玄米千粒重の低下と乳白米の発生が懸念されるため、早期に防除を行う。</p>

地域名	移植時期	生育ステージ	対平年遅速	生育概況及び今後の栽培管理	備考
	5 月 7 日	「あきたこまち」 幼穂形成期 「コシヒカリ」 幼穂形成期	「あきたこまち」 3 日遅い (幼穂長からの 出穂期の予測) 「コシヒカリ」 4 日遅い (幼穂長からの 出穂期の予測)	<p>◇5 月第 2 半旬～7 月第 1 半旬は、平均気温が平年よりやや高く(+0.4℃)、日照時間はやや多く(107%)推移した。</p> <p>◇7 月 6 日時点の幼穂長は、「あきたこまち」で 24.0mm、「コシヒカリ」で 1.6mm であった。 幼穂長から予測される出穂期は、「あきたこまち」で平年より 3 日遅い 7 月 19 日頃、「コシヒカリ」では平年より 4 日遅い 7 月 30 日頃である(今後気温が平年並に推移した場合)</p> <p>両品種の生育について、草丈は両品種とも平年並、茎数は両品種とも平年よりやや少なく、葉色は「あきたこまち」で淡く、「コシヒカリ」でやや淡い。</p> <p>◆今後の栽培管理 穂肥は幼穂長を確認し適期に行う。「コシヒカリ」の穂肥の施用時期の目安は、出穂前 15 日頃(幼穂長:30mm)である。</p>	

水 稻 の 生 育 状 況

(水田利用研究室)

表1 4月26日移植(龍ヶ崎市, 移植後70日, 7月5日調査)

品 種	草 丈			茎 数			葉色(カラスケール)			葉色(SPAD)			主 稈 葉 数		
	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/m ²)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年 (枚)	前年差 (枚)	平年差 (枚)
あきたこまち	76.9	105 (73.4)	104 (74.2)	625	110 (566)	100 (625)	3.1	-0.4 (3.5)	-1.0 (4.1)	32.3	-1.7 (34.0)	-2.0 (34.3)	12.5	+0.5 (12.0)	+0.7 (11.8)
コシヒカリ	81.6	103 (78.9)	106 (77.0)	564	96 (590)	88 (637)	2.1	-0.8 (2.9)	-0.8 (2.9)	26.4	-1.0 (27.4)	±0 (26.4)	12.3	+0.3 (12.0)	+0.8 (11.5)
ふくまる	76.5	105 (72.9)	103 (74.1)	594	99 (600)	98 (603)	3.5	-0.1 (3.6)	-0.6 (4.1)	33.7	+0.1 (33.6)	+0.2 (33.5)	13.1	+0.2 (12.9)	+0.7 (12.4)

表2 5月7日移植(龍ヶ崎市, 移植後60日, 7月6日調査)

品 種	草 丈			茎 数			葉色(カラスケール)			葉色(SPAD)			主 稈 葉 数		
	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/m ²)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年	前年差	平年差	本年	前年差	平年差	本年 (枚)	前年差 (枚)	平年差 (枚)
あきたこまち	70.0	96 (73.1)	98 (71.5)	572	81 (703)	88 (649)	2.9	-0.5 (3.4)	-0.8 (3.7)	29.1	-2.8 (31.9)	-2.8 (31.9)	12.0	±0 (12.0)	+0.6 (11.4)
コシヒカリ	74.1	98 (75.5)	102 (72.9)	567	86 (658)	83 (679)	2.4	-0.7 (3.1)	-0.4 (2.8)	26.1	+3.1 (29.2)	-1.0 (27.1)	11.7	±0 (11.7)	+0.4 (11.3)

注1) カッコ内の数値は前年または平年の実測値

注2) 栽培概要

1.苗質:稚苗

2.植え付け本数:5本/株

3.基肥量:

あきたこまち N:P₂O₅:K₂O = 0.7:0.7:0.7(kg/a)

コシヒカリ N:P₂O₅:K₂O = 0.6:0.6:0.6(kg/a)

ふくまる N:P₂O₅:K₂O = 0.8:0.8:0.8(kg/a)

4.追肥時期および追肥施用量

(4月26日移植) あきたこまち 6月22日 N:K₂O = 0.3 : 0.3 (kg/a)

ふくまる 6月27日 N:K₂O = 0.4 : 0.4 (kg/a)

(5月7日移植) あきたこまち 7月4日 N:K₂O = 0.3 : 0.3 (kg/a)

5.栽植密度(株/m²):

現地の実情を踏まえ、前年から一部変更

	本年	前年	平成25～28年
あきたこまち	18.5	18.5	22.2
コシヒカリ	15.2	15.2	22.2
ふくまる	18.5	18.5	18.5

6.平年値:平成25～29年の5年間の平均値

表3 幼穂長からみた出穂期予測

移植時期	品種	調査日	主稈幼穂長		出穂期予測			出穂状況
			本年 (mm)	平年 (mm)	本年予測値 (月日)	平年値※ (月日)	平年差 (日)	
4/26移植	あきたこまち	-	-	-	7/8	7/11	-3	出穂期確定
	コシヒカリ	7/5	5.1	13.0	7/25	7/22	+3	
	ふくまる	7/5	173.6	123.2	7/12	7/15	-3	
5/7移植	あきたこまち	7/6	24.0	45.0	7/19	7/16	+3	
	コシヒカリ	7/6	1.6	3.0	7/30	7/26	+4	

注) 予測は平成16、18年度主要成果「有効積算温度と幼穂長による水稻の出穂期予測」に基づく。

幼穂が100mm以上の場合、「幼穂長と出穂前日数（星川）」に基づいて予測した。


今後気温が平年並に推移した場合の予測。

「ふくまる」は、「あきたこまち」の出穂期予測に準じた。


※平年値は平成25～29年の出穂期の平均値。

平成30年の生育経過グラフ


4月26日移植
あきたこまち




4月26日移植
コシヒカリ




4月26日移植
ふくまる



あきたこまち 5月7日移植



5月7日移植
コシヒカリ







表4 移植時期別気象条件(龍ヶ崎市)

移植時期	期間	平均気温(℃)			積算平均気温(℃)			積算日照時間(hr)		
		本年	平年	平年差	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比(%)
4月26日移植	4月第6半旬～7月第1半旬	20.5	19.9	+0.6	1455	1412	+43	456	437	104
5月7日移植	5月第2半旬～7月第1半旬	20.8	20.4	+0.4	1267	1247	+20	376	351	107

注) 平年値:平成25～29年の5年間の平均値
アメダス龍ヶ崎観測所データより作成

【 4 月 26 日移植の生育状況 】 撮影日:7/6

あきたこまち



コシヒカリ



ふくまる



【 5 月 7 日移植の生育状況 】 撮影日:7/6

あきたこまち



コシヒカリ

