


水稻生育情報 No.3

令和 7 年 6 月 26 日
県央農林事務所 経営・普及部門
(水戸地域農業改良普及センター)
TEL: 029-227-1521

中干しまでは、浅水管理により分けつを促進しましょう。
中干し終了後は、間断かんがいにより根の健全化を図りましょう。

〔気象概況〕(6月20日現在)※水戸气象台データより

6月第1半旬から第4半旬(6/1～6/20)にかけての水戸市の気象は、平均気温は平年より高く、特に第4半旬は平年より5.3℃高かった。日照時間は第1半旬から第2半旬までは平年並～短く、第3半旬は平年比41%とかなり短く、第4半旬は平年比254%とかなり長かった。



〔生育概況〕(6月20日現在)

管内の「コシヒカリ」定点圃場では、草丈は那珂市が平年並で、他の3か所で平年よりやや長い～長い。茎数は小美玉市で平年より極めて多く、那珂市はやや多く、茨城町は平年並、水戸市はやや少なかった。葉色はやや淡い～平年並である。

「コシヒカリ」定点調査圃場の生育調査結果(6月20日)

調査地点	年度	移植日 (月/日)	移植日から 調査日までの 日数	栽植密度 (株/坪)	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	茎数 (本/株)	葉色 (カラー スケール)
水戸市 坏大野	R7	5/4	47日	51.6	53.2	513.0	33.1	4.0
	平年値	5/4	47日	51.6	48.9	600.0	38.7	4.3
茨城町 上石崎	R7	5/4	47日	53.6	53.2	470.1	29.2	4.4
	平年値	5/8	43日	54.0	47.9	467.3	28.8	4.5
小美玉市 上玉里	R7	5/18	33日	54.9	42.2	343.2	20.8	4.7
	平年値	5/22	29日	55.7	35.4	244.2	14.6	4.5
那珂市 鹿島	R7	5/28	23日	51.3	31.4	282.0	18.3	4.3
	平年値	5/26	25日	50.7	32.9	247.9	16.3	4.3

〔今後の栽培管理〕 中干し後は、間断かんがいで、根の健全化をはかりましょう。

1 中干しの実施

- ・必要茎数(コシヒカリでは330本/㎡程度)を確保したら、速やかに中干しを開始します。
- ・ただし、出穂25日前頃(5月上旬に移植した「コシヒカリ」では6月下旬頃)に幼穂ができ始めるため、それまでに中干しを終了し、その後は「間断かんがい」を行います。

2 中干し後の水管理

- ・中干し後の水稻は、常時湛水すると「根ぐされ」しやすくなります。入水と自然落水を交互に繰り返す「間断かんがい」により、根に酸素を供給し、根を健全に維持しましょう。

