


# サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2018年2月20日  
 水揚港 : 銚子  
 漁場 : N 35°48'  
 E 141°08'

m マサバ  
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	29.2	294.1	17
2	m	29.9	269.0	7
3	m	31.4	353.0	10
4	m	29.8	280.8	10
5	m	29.0	240.7	8
6	m	28.6	238.6	13
7	m	30.4	367.7	20
8	m	30.7	331.1	16
9	m	30.8	304.6	12
10	m	31.4	329.7	16
11	m	29.6	273.1	12
12	m	30.8	330.2	15
13	m	31.9	432.9	23
14	m	31.3	342.3	18
15	m	27.4	207.4	9
16	m	26.5	167.7	7
17	m	26.5	171.6	6
18	m	28.0	198.2	6
19	m	29.7	269.5	9
20	m	28.2	210.8	6
21	m	27.1	202.2	12
22	m	29.5	282.0	13
23	m	30.4	293.6	11
24	m	30.6	280.0	7
25	m	27.5	188.0	5
26	m	26.7	187.9	11
27	m	26.6	170.7	5
28	m	29.2	233.4	7
29	m	29.5	257.9	10
30	m	24.8	137.4	5

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製  
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

