


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2018年5月22日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 35°48'
 E 141°06'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	33.8	487.1	7
2	m	31.9	384.6	7
3	m	32.3	409.0	8
4	m	31.6	347.0	5
5	m	35.4	514.8	7
6	m	30.4	314.9	9
7	g	25.6	194.6	8
8	m	34.3	474.1	6
9	m	30.1	295.0	7
10	m	29.6	291.3	6
11	m	30.6	295.3	5
12	m	34.6	453.5	7
13	m	31.4	318.0	6
14	m	30.8	328.8	7
15	m	25.7	178.3	7
16	m	31.9	333.9	7
17	m	29.8	301.5	9
18	m	33.0	381.4	6
19	m	30.3	284.7	6
20	m	32.0	389.8	7
21	m	29.1	254.1	6
22	m	31.8	344.6	5
23	m	29.4	268.1	7
24	m	28.1	242.2	7
25	m	25.9	193.8	6
26	m	27.9	231.1	5
27	m	27.6	242.3	7
28	m	26.2	178.2	6
29	m	25.4	159.9	5
30	m	22.0	111.5	5

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

