


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2019年2月22日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 36°05'
 E 140°53'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	37.4	743.0	18
2	m	32.3	386.8	9
3	m	34.1	505.2	13
4	m	33.2	422.4	19
5	m	31.2	330.9	12
6	m	32.6	430.5	12
7	m	33.7	476.2	17
8	m	32.0	372.2	10
9	m	35.8	526.9	9
10	m	30.6	365.5	15
11	m	30.7	356.0	20
12	m	32.4	447.8	17
13	m	33.6	429.8	16
14	m	32.3	354.4	8
15	m	33.3	454.8	17
16	m	32.1	358.1	16
17	m	31.8	345.0	11
18	m	33.9	462.3	15
19	m	32.4	352.8	9
20	m	30.9	315.6	10
21	m	27.2	189.6	7
22	m	29.8	272.5	8
23	m	30.9	338.8	15
24	m	31.2	301.3	7
25	m	29.9	281.2	10
26	m	30.5	289.4	7
27	m	30.3	306.2	11
28	m	29.2	251.5	10
29	m	25.5	149.7	6
30	g	24.1	134.9	5

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

