

絶滅

ヤチスギラン

Lycopodium inundatum L.

ヒカゲノカズラ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（近畿地方以北）・北海道／北半球の温帯

生 育 地 湿原に生える。高萩市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

ハマホラシノブ

Sphenomeris biflora (Kaulf.) Tagawa

ホングウシダ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012

分 布 本州（関東地方南部・伊豆諸島・伊豆半島・紀伊半島）・四国（南部）・九州・琉球・小笠原／中国大陸（南部）・台湾・マリアナ諸島・フィリピン（北部）

生 育 地 海浜の比較的日当たりのよい地上や岩隙に生える。日立市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

オニイノデ

Polystichum rigens Tagawa

オシダ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（茨城県以西）／中国

生 育 地 山地の樹林下に生える。真弓山（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他



常陸太田市（内山）

ホザキヤドリギ

Loranthus tanakae Franch. et Sav.

ヤドリギ

茨城県2012 絶滅

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（東北地方・中部地方中北部）／朝鮮・中国北部

生 育 地 ミズナラ、クリ、ハンノキなどの落葉広葉樹に半寄生する。高萩市（89）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

イトハコベ

Stellaria filicaulis Makino

ナデシコ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（関東以北）／朝鮮・中国（東北）・モンゴル

生 育 地 低地の湿地に生える。行方市（115）、潮来市（115）、取手市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

リュウキンカ

Caltha palustris L. var. *nipponica* H.Hara

キンポウゲ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・九州／朝鮮

生 育 地 浅い水中や湿地に生える。北茨城市（24）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他



（県博収蔵標本：北茨城市産）

ムジナモ

Aldrovanda vesiculosa L.

モウセンゴケ科

茨城県2012 絶滅
茨城県1997 絶滅種
環境省2012 絶滅危惧 I A類 (CR)

分 布 本州／朝鮮・中国（東北）・インド・ヨーロッパ・アフリカ・オーストラリア

生 育 地 浅い水中に生える。全国的に見ても野生絶滅に近い状態である。霞ヶ浦（115）、筑西市（115）、常総市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他



(常総市：県博収蔵標本)

マルバシモツケ

Spiraea betulifolia Pall. var. *betulifolia*

バラ科

茨城県2012 絶滅
茨城県1997 絶滅危惧種
環境省2012

分 布 北海道・本州（中北部）／東シベリア・樺太・千島

生 育 地 山地の草原に生える。八溝山（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他



(県博収蔵標本：八溝山産)

センダイハギ

Thermopsis lupinoides (L.) Link

マメ科

茨城県2012 絶滅
茨城県1997 絶滅種
環境省2012

分 布 北海道・本州（中部以北）／朝鮮・中国・ソ連極東地方・北アメリカ北部

生 育 地 海岸の砂浜に生える。高萩市（55）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ハマビシ

Tribulus terrestris L.

ハマビシ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 絶滅危惧 I B類 (EN)

分 布 本州（千葉県及び福井県以西）・四国・九州
／世界の熱帯～暖帯の海岸や内陸の乾燥地

生 育 地 海岸の砂浜に生える。大洗町（115）、鹿嶋市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ツクバトウキ

Angelica acutiloba (Siebold et Zucc.) Kitag. f. *tsukubana* Hikino

セリ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州（茨城県筑波山）

生 育 地 山中に生える。筑波山（13）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他 トウキの品種。筑波山で発見命名された植物である。

ハイハマボッサ

Samolus parviflorus Raf.

サクラソウ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州／北アメリカ

生 育 地 海岸近くの湿地にまれに生える。県北部の海岸（24）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

オオアオカモメヅル（ツクバカモメヅル）

Vincetoxicum nipponicum (Matsum.) Kitag.

ガガイモ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（中北部）

生 育 地 草地に生える。筑波山（63）と佐白山（72）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他 筑波山で発見命名された植物である。



（県博収蔵標本：笠間市産）

ヤブムグラ

Galium newerthii Franch. et Sav.

アカネ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（東京都・千葉県・神奈川県など関東地方南部）〔日本固有種〕

生 育 地 丘陵地に生える。神栖市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

タチコゴメグサ

Euphrasia maximowiczii Wettst.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（中国地方西部・近畿地方～東北地方南部）・四国（西部）・九州（中北部）

生 育 地 日当たりのよい高原の草地に生える。三鈷室山（115）、八溝山（128）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他



（県博収蔵標本：高萩市産）

ヒメトラノオ

Pseudolysimachion rotundum (Nakai) Holub var. *petiolatum* (Nakai) T.Yamaz.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（中部地方・関東地方）〔日本固有種〕

生 育 地 湿地に生える。水戸市（127）、つくば市（115）、
鶏足山（72）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他



（県博収蔵標本：鶏足山産）

ツクバウゲイスカグラ

Lonicera tenuipes Nakai var. *tsukubana* Satake (100)

スイカズラ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012

分 布 本州（茨城県筑波山）

生 育 地 樹林下に生える。筑波山（100）で発見命名
された。

選 定 理 由

そ の 他



筑波山産栽培（福田）

ホロマンノコギリソウ（キタノコギリソウ）

Achillea alpina L. var. *angustifolia* (H.Hara) Kitam.

キク科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 南千島・北海道・本州（中部以北）／樺太

生 育 地 日当たりのよい草地に生える。ひたちなか市
（130）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

絶
滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

マルバオモダカ

Caldesia parnassifolia (Bassi, ex L.) Parl.

オモダカ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州・四国・九州・奄美／中国・インド・オーストラリア・マダガスカル

生 育 地 水中に生える。坂東市 (94) に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

シバナ

Triglochin asiatica (Kitag.) A. et D.Love

ホロムイソウ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・四国・九州／北半球の温帯

生 育 地 河口や干潟の縁の塩分を含む湿地に生える。大洗町 (94) に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

エゾヤナギモ

Potamogeton compressus L.

ヒルムシロ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州 (中部以北) ／北半球

生 育 地 水中に生える。石岡市 (94) に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

ガシャモク

Potamogeton dentatus Hagstr.

ヒルムシロ科

茨城県2012	絶滅
茨城県1997	絶滅種
環境省2012	絶滅危惧 I A類 (CR)

分 布	本州(関東地方・近畿地方) / 中国(山東省)
生 育 地	水中に生える。霞ヶ浦(98)に記録がある。
選 定 理 由	
そ の 他	

絶滅

絶滅危惧 I A類

絶滅危惧 I B類

絶滅危惧 II類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

コシガヤホシクサ

Eriocaulon heleocharioides Satake

ホシクサ科

茨城県2012	絶滅
茨城県1997	絶滅危惧種
環境省2012	野生絶滅(EW)

分 布	本州(埼玉県・茨城県) [日本固有種]
生 育 地	河川や溜池に生える。下妻市砂沼(115)に記録がある。
選 定 理 由	
そ の 他	現在野生復帰を目指したプロジェクトが進行中である。



下妻市(内山)

ヒンジモ

Lemna trisulca L.

ウキクサ科

茨城県2012	絶滅
茨城県1997	絶滅種
環境省2012	絶滅危惧 II類 (VU)

分 布	北海道・本州・四国 / 南アメリカ以外の各地
生 育 地	植物体は水中に浮き、薄く、細くて長い柄で連なり、多数集まって群体をつくるが、花期には花をつけた3~数個が群体となって、水上に現れる。霞ヶ浦(24)に記録がある。
選 定 理 由	
そ の 他	

トダスゲ

Carex aequalta Kuk.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 絶滅危惧 I A類 (CR)

分 布 本州（関東地方と名古屋付近）・九州（北部）
／中国（中部）

生 育 地 川岸の草地などに生える。筑波山（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

ヒエスゲ

Carex longirostrata C.A.Mey.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 北海道・本州（中北部）／樺太・千島・朝鮮
～シベリア東部

生 育 地 山地草原に生える。水戸市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

エゾサワスゲ

Carex viridula Michx.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州（中北部）／東アジア北部・北
アメリカ

生 育 地 湿地にややまれに生える。高萩市（115）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

カガシラ

Scleria caricina (R.Br.) Benth.

カヤツリグサ科

茨城県2012	絶滅
茨城県1997	絶滅種
環境省2012	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)
分 布	本州（千葉県以西）・四国・九州・琉球／台湾・インド・マレーシア・オーストラリア
生 育 地	湿地にややまれに生える。つくば市（24）に記録がある。
選 定 理 由	
そ の 他	つくば市の生育地はマツ林に囲まれた広大な湿原であったが、工業団地の造成で埋められ絶滅した。

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

アツモリソウ

Cypripedium macranthos Sw. var. *speciosum* (Rolfe) Koidz.

ラン科

茨城県2012	絶滅
茨城県1997	絶滅危惧種
環境省2012	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)
分 布	南千島・北海道・本州（中部以北）／アジア北東部～ヨーロッパ東部
生 育 地	山地の草原か疎林内に生える。北茨城市（115）、筑波山（115）、城里町（115）に記録がある。
選 定 理 由	
そ の 他	



（県博収蔵標本：北茨城市産）

ノビネチドリ

Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo

ラン科

茨城県2012	絶滅
茨城県1997	絶滅危惧種
環境省2012	
分 布	北海道・本州（中北部）・四国・九州／樺太・カムチャツカ・朝鮮
生 育 地	山地の樹林下の湿ったところに生える。八溝山（115）に記録がある。
選 定 理 由	
そ の 他	



（県博収蔵標本：八溝山産）

ヒメフタバラン

Listera japonica Blume

ラン科

茨城県2012 絶滅

茨城県1997 絶滅種

環境省2012

分 布 本州（宮城県・山形県以南）・四国・九州・琉球

生 育 地 山地の樹林下に生える。鹿嶋市（65）に記録がある。

選 定 理 由

そ の 他

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種