

アイズシモツケ

Spiraea chamaedryfolia L. var. *pilosa* (Nakai) H.Hara

バラ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（中部地方以北）・九州（熊本県）
／東アジア・シベリア

生 育 地 山地の湿り気のある斜面や岩場などに生える。
久慈山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

タヌキマメ

Crotalaria sessiliflora L.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（東东南部以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・
中国・東南アジア・インド

生 育 地 平地の湿地，日当たりのよい草地などに生える。
県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



土浦市（内山）

イヌハギ

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Siebold ex Maxim.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・インド・
ヒマラヤ

生 育 地 草地や海に近い日当たりのよい砂地に生える。
常陸大宮市，日立市，ひたちなか市，神
栖市，古河市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

マキエハギ

Lespedeza virgata (Thunb.) DC.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮・中国（本土・台湾）

生 育 地 山野の日当たりのよい乾いた道ばたや土壌の浅い草地に生える。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸大宮市（内山）

タンキリマメ

Rhynchosia volubilis Lour.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（千葉県以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・フィリピン

生 育 地 海岸や山野の草原，林縁などに生える。鉾田市，鹿嶋市，神栖市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



鉾田市（内山）

ヨツバハギ

Vicia nipponica Matsum.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山野の草地や道ばたの斜面などに生える。日立市，大子町，常陸大宮市，城里町などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸大宮市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

オオバクサフジ

Vicia pseudo-orobus Fisch. et C.A.Mey.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国・ウ
スリー・アムール・シベリア東部

生 育 地 山野の草原や林縁に生える。県内各地に県内
各地に点々と生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

ナツフジ

Wisteria japonica Siebold et Zucc.

マメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（東海道以西）・四国・九州

生 育 地 暖地の林内や林縁などに生える。潮来市に生
育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない

そ の 他



潮来市産栽培（内山）

タチフウロ

Geranium krameri Franch. et Sav.

フウロソウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（東北地方南部～中部地方）・四国・九
州／朝鮮・アムール・中国（東北）

生 育 地 山野の草地などに生える。県内各地に点々と
生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他 フシゲタチフウロを含む。



常陸太田市（内山）

オオイタヤマメイツ

Acer shirasawanum Koidz.

カエデ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（福島県以西）・四国 [日本固有種]

生 育 地 冷温帯に生える。北茨城市，八溝山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



八溝山（内山）

サワダツ

Euonymus melananthus Franch. et Sav.

ニシキギ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 冷温帯の沢筋にある林下に生える。筑波山，加波山に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

イソノキ

Rhamnus crenata Siebold et Zucc.

クロウメモドキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山野の溜池周辺などに生える。水戸市，笠間市，銚田市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



水戸市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

シナノキ

Tilia japonica (Miq.) Simonk.

シナノキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州

生 育 地 冷温帯の山地に生える。高萩市，大子町，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山（内山）

サクラスミレ

Viola hirtipes S.Moore

スミレ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（東北）・ウスリー

生 育 地 山地の草原に生える。県北山地の草原や落葉樹林下に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



高萩市（内山）

ミズマツバ

Rotala mexicana Cham. et Schltdl.

ミソハギ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・フィリピン・インド・カフカズ・中央アジア・アフリカ

生 育 地 水田や湿地に生える。常陸大宮市，日立市，笠間市，筑西市などに生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



つくば市（内山）

ミズキカシグサ

Rotala rosea (Poir.) C.D.K.Cook

ミソハギ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮

生 育 地 水田や湿地に生える。日立市に生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



日立市 (安嶋)

ウシタキソウ

Circaea cordata Royle

アカバナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国・ウ
スリー・ヒマラヤ

生 育 地 湿り気のある山地の林下生える。八溝山, 日
立市, 水戸市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (内山)

イワアカバナ

Epilobium amurense Hausskn. subsp. *cephalostigma* (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven

アカバナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州／アムール・ウスリー・
中国 (東北・台湾)・千島

生 育 地 山間の湿地に生える。北茨城市, 高萩市, 常
陸太田市, 八溝山などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発, 遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：北茨城市産)

絶
滅

絶
滅
危
惧
Ⅰ
A
類

絶
滅
危
惧
Ⅰ
B
類

絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①注
目
種

情
報
不
足
②現
状
不
明
種

ミズユキノシタ

Ludwigia ovalis Miq.

アカバナ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮（済州島）・中国（本土・台湾）

生 育 地 溜池や沼の水辺に生える。常陸太田市，笠間市，水戸市，神栖市などに生育する。

選 定 理 由 溜池の埋立

そ の 他



常陸太田市（内山）

ホタルサイコ

Bupleurum longiradiatum Turcz. var. *elatus* (Koso-Pol.) Kitag.

セリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州

生 育 地 日当たりのよい草地に生える。主に久慈山地に生育する。

選 定 理 由 個体数が少ない，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



大子町（内山）

イワセントウソウ

Pternopetalum tanakae (Franch. et Sav.) Hand.-Mazz.

セリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 深山の湿ったところに生える。北茨城市，高萩市，三鈷室山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ヌマゼリ

Sium suave Walter var. *nipponicum* (Maxim.) H.Hara

セリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（東北）

生 育 地 湿地に生える。高萩市，日立市，笠間市，水戸市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市（内山）

シャクジョウソウ

Monotropa hypopithys L.

イチヤクソウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／アジア・北アメリカ・ヨーロッパ

生 育 地 山地の林下のやや暗いところに生える。県内ではまれに生育しているが，個体数は少ない。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

シロヤシオ（ゴヨウツツジ）

Rhododendron quinquefolium Bisset et S.Moore

ツツジ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（岩手県以南の太平洋側）・四国〔日本固有種〕

生 育 地 山地に生える。北茨城市，高萩市，八溝山，男体山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヤナギトラノオ

Lysimachia thyrsiflora L.

サクラソウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅種

環境省2012

分 布 北海道、本州（中部以北）／北半球の寒帯

生 育 地 寒冷地の湿原に生える。霞ヶ浦の湖岸に生育する。

選 定 理 由 湖岸の埋立

そ の 他



土浦市（福田）

イヌセンブリ

Swertia tosaensis Makino

リンドウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山野の湿地に生える。県内では数か所で確認されているが個体数は少ない。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



小美玉市（内山）

ガガブタ

Nymphoides indica (L.) Kuntze

ミツガシワ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国・東南アジア・アフリカ・オーストラリア

生 育 地 湖沼に生える。霞ヶ浦周辺に生育するが，生育状況はよくない。

選 定 理 由 湖岸の埋立

そ の 他



稲敷市（内山）

アサザ

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze

ミツガシワ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国からユーラシアの温帯

生 育 地 湖沼に生える。北浦や霞ヶ浦などでは一部で群生するが、面積は減少している。

選 定 理 由 湖岸の埋立

そ の 他



潮来市 (内山)

コカモメヅル

Tylophora floribunda Miq.

ガガイモ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山野の草地に生える。生育地も個体数も減少している。

選 定 理 由 草地の開発、遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：大子町産)

スズサイコ

Vincetoxicum pycnostelma Kitag.

ガガイモ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・ダフリア・中国

生 育 地 日当たりのよいやや乾いた草地に生える。生育地も個体数も減少している。

選 定 理 由 草地の開発、遷移の進行

そ の 他



大子町 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

アリドオシ

Damnacanthus indicus Gaertn.f.

アカネ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／朝鮮半島南部・中国中部

生 育 地 林内に生える。生育地は限られるが、生育状況は良い。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 県北の生育地は北限に近い生育地と思われる。



潮来市（内山）

オオアリドオシ（ニセジュズネノキ）

Damnacanthus indicus Gaertn.f. var. *major* (Siebold et Zucc.) Makino

アカネ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／朝鮮南部・中国東部

生 育 地 林内に生える。県内の生育地は少ない。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



佐白山（内山）

ハナムグラ

Galium tokyoense Makino

アカネ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（関東・中部）／朝鮮・中国（東北）

生 育 地 河川敷の湿った草地などに生える。筑西市、坂東市、常総市、霞ヶ浦周辺などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発、遷移の進行

そ の 他



稲敷市（内山）

スナビキソウ

Argusia sibirica (L.) Boehmer

ムラサキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・シベリア・ヨーロッパ

生 育 地 海岸の砂地に生える。生育地は減少している。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他



鹿嶋市 (内山)

オニルリソウ

Cynoglossum asperrimum Nakai

ムラサキ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山地に生える。八溝山，北茨城市，常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (内山)

ヒイラギソウ

Ajuga incisa Maxim.

シソ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧ⅠB類 (EN)

分 布 本州 (中部・関東) [日本固有種]

生 育 地 山の木陰に生える。筑波山，御前山，城里町に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

キセワタ

Leonurus macranthus Maxim.

シソ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道・本州・四国・九州／中国

生 育 地 山地や丘陵の草地に生える。大子町，常陸太田市，日立市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



日立市 (内山)

ヒメハッカ

Mentha japonica (Miq.) Makino

シソ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州 [日本固有種]

生 育 地 湿地に生える。県北から中央部にかけて点々と生育するが，個体数は少ない。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市 (内山)

ヤマジソ

Mosla japonica (Benth. ex Oliv.) Maxim.

シソ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮南部

生 育 地 日当たりのよい丘陵に生える。八溝山，高萩市，常陸太田市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：筑波山産)

ナミキソウ

Scutellaria strigillosa Hemsl.

シソ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（東北）・千島・樺太

生 育 地 海岸の砂地に生える。日立市，ひたちなか市，銚田市などに生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他



銚田市（藤田）

マルバノサウトウガラシ

Deinostema adenocaulum (Maxim.) T.Yamaz.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州・四国・九州／朝鮮南部

生 育 地 水田や湿地に生える。常陸太田市，水戸市，小美玉市，牛久市などに生育する。

選 定 理 由 農地の改修，農業の使用

そ の 他



水戸市（内山）

オオアブノメ

Gratiola japonica Miq.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（宮城県以南）・九州／朝鮮・中国（本土・東北）・ウスリー

生 育 地 湿地に生える。県内の生育地は少ない。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヤマウツボ

Lathraea japonica Miq.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／朝鮮（鬱陵島）

生 育 地 やや湿気のある落葉樹林内に生える。北茨城市、常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 本県産のものはケヤマウツボの型である。



真弓山（内山）

クチナシグサ

Monochasma sheareri (S.Moore) Maxim.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東・中京・中国）・四国・九州（北部）
／中国中部

生 育 地 低地の落葉樹林下に生える。大子町、常陸大宮市、坂東市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

ゴマノハグサ

Scrophularia buergeriana Miq.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（関東南部・中部・中国）九州／朝鮮・中国（北部・東北）

生 育 地 やや湿った草原に生える。常総市などに生育する。県内の生育地は少ない。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



坂東市（内山）

オオヒキヨモギ

Siphonostegia laeta S.Moore

ゴマノハグサ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	危急種
環境省2012	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)
分 布	本州 (関東・中京・中国)・四国 (瀬戸内側) / 中国 (中南部)
生 育 地	山地や丘陵の草地に生える。県内では高鈴山や桜川市などに生育する。
選 定 理 由	草地の開発, 遷移の進行
そ の 他	



水戸市 (内山)

イヌノフグリ

Veronica polita Fr. subsp. *lilacina* (T.Yamaz.) T.Yamaz.

ゴマノハグサ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	
環境省2012	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)
分 布	本州・四国・九州・琉球 / 東南アジアの温帯～暖帯
生 育 地	土手や道端の草地などに生える。大子町, 高萩市, 水戸市, 鹿嶋市などに生育する。
選 定 理 由	外来種との競合
そ の 他	



ひたちなか市 (内山)

ハマウツボ

Orobanche coerulea Stephan ex Willd.

ハマウツボ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	
環境省2012	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)
分 布	北海道・本州・四国・九州・琉球 / 中国・朝鮮・シベリア・ヨーロッパ東部
生 育 地	海岸の砂地に生える。日立市, 東海村, 鹿嶋市などに生育する。
選 定 理 由	海岸の開発
そ の 他	



ひたちなか市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現狀不明種

オミナエシ

Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.

オミナエシ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国・シベリア東部

生 育 地 日当たりのよい山の草地に生える。県内の生育地は近年急激に減少している。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他 秋の七草として知られている。



小美玉市（内山）

ツルギキョウ

Campanumoea javanica Blume var. *japonica* Makino

キキョウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／台湾

生 育 地 山地の林下や林縁に生える。常陸太田市，笠間市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

バアソブ

Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.

キキョウ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（東北）・ウスリー・アムール

生 育 地 山地の林下や林縁などに生える。大子町，小美玉市，下妻市，古河市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



（県博収蔵標本：常総市産）

キキョウ

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

キキョウ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	危急種
環境省2012	絶滅危惧Ⅱ類 (VU)
分 布	北海道・本州・四国・九州・奄美（請島）／朝鮮・中国・ウスリー
生 育 地	山野の草地に生える。県内での生育地は著しく減少している。
選 定 理 由	園芸採取，草地の開発，遷移の進行
そ の 他	秋の七草として知られている。



常陸太田市（安嶋）

ノコギリソウ

Achillea alpina L. var. *longiligulata* H.Hara

キク科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	
環境省2012	
分 布	北海道・本州／朝鮮南部・樺太・中国・ベトナム北部・ネパール・シベリア東部・カムチャツカ・アリューシャン・北アメリカ
生 育 地	山地の草原に生える。高萩市，三鈷室山に生育する。
選 定 理 由	草地の開発，遷移の進行
そ の 他	



常陸太田市（大津）

カワラハハコ

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook.f. subsp. *yedoensis* (Franch. et Sav.) Kitam.

キク科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	
環境省2012	
分 布	北海道・本州・四国・九州 [日本固有種]
生 育 地	川原の砂地に生える。大子町，常陸大宮市，神栖市，古河市などに生育する。
選 定 理 由	河川の改修
そ の 他	



(県博収蔵標本：御前山産)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

シロヨモギ

Artemisia stelleriana Besser

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（新潟県・茨城県以北）・北海道／樺太・千島・朝鮮・カムチャツカ・オホーツク海沿岸

生 育 地 海岸の砂地に生える。北茨城市，日立市，ひたちなか市，鉾田市などに生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他 県内の生育地は南限に近い生育地である。



ひたちなか市（内山）

ヒメシオン

Aster fastigiatus Fisch.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国・ダフリア

生 育 地 草原の湿地に生える。休耕田などで見られることもある。高萩市，大子町，常陸大宮市，下妻市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



城里町（藤田）

ウラギク

Aster tripolium L.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 北海道（東部）・本州（関東以西の太平洋側）・四国・九州

生 育 地 海岸の湿地に生える。神栖市に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



神栖市（高田）

コハマギク

Chrysanthemum yezoense Maek.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道（根室から太平洋岸に沿って渡島）・
本州（青森県竜飛崎から太平洋岸に沿って茨
城県）〔日本固有種〕

生 育 地 海岸の岩上に生える。県北部海岸の崖の上や
草原などに生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他 ひたちなか市は南限に近い生育地である。



日立市（藤田）

フジバカマ

Eupatorium japonicum Thunb.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 川の堤防などに生える。主に県南，県西の河
川の草原などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他 秋の七草として知られている。



常総市（藤田）

アキノハハコグサ

Gnaphalium hypoleucum DC.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧ⅠB類（EN）

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国・東南アジア・
インド

生 育 地 やや乾いた山地の崖などに生える。主に県北
部の山地に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶
滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種