

マルバダケブキ

Ligularia dentata (A.Gray) H.Hara

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（中部から東北）・四国（まれ）／中国大陸

生 育 地 山地の草原や林下に生える。県北部の山地に生育するが、笠間市や城里町などの低地にも生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

ハマギク

Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（青森県から茨城県までの太平洋側）
[日本固有種]

生 育 地 海岸の崖に生える。北茨城市、高萩市、日立市、ひたちなか市に生育する。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他 ひたちなか市は南限に近い生育地である。



日立市（藤田）

ミヤコアザミ

Saussurea maximowiczii Herder

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州（福島県以南）・四国（高知県）・九州／朝鮮・中国（東北）・アムール

生 育 地 山地の湿地や草原に生える。北茨城市、高萩市、八溝山、大子町などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

キクアザミ

Saussurea ussuriensis Maxim.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（福島県以南）・九州／朝鮮・中国・ウ
スリー

生 育 地 日当たりのよい山地の草原に生える。県北部
の山地や加波山などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



日立市（内山）

ハバヤマボクチ

Synurus excelsus (Makino) Kitam.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（福島県以南）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地のやや乾いた草原に生える。北茨城市，
高萩市，ひたちなか市，鉾田市などに生育す
る。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（内山）

オカオグルマ

Tephrosia integrifolia (L.) Holub subsp. *kirilowii* (Turcz. ex DC.) B.Nord.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 日当たりのよい乾いた草原に生える。主に県北
部の山地の草原に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



大子町（内山）

絶
滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

サワオグルマ

Tephrosia pierotii (Miq.) Holub

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球 [日本固有種]

生 育 地 日当たりのよい山間の湿地に生える。北茨城市と水戸市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



北茨城市 (内山)

ネコノシタ

Wedelia prostrata (Hook. et Arn.) Hemsl.

キク科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州 (関東および北陸以西)・四国・九州・小笠原／朝鮮・台湾・ベトナム

生 育 地 海岸の砂地に生える。北部の海岸には少ない。

選 定 理 由 海岸の開発

そ の 他



ひたちなか市 (内山)

トウゴクヘラオモダカ

Alisma rariflorum Sam.

オモダカ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州 (関東以南)・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 水田や湿地に生える。県北や県央地域に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市 (内山)

アギナシ

Sagittaria aginashi Makino

オモダカ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 水田や浅い池に生える。県北や県央地域に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



大子町 (内山)

スブタ

Blyxa echinosperma (C.B.Clarke) Hook.f.

トチカガミ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州・四国・九州・琉球／東アジア・東南アジア・オーストラリア

生 育 地 水田や溝に生える。常陸太田市，笠間市などに生育する。

選 定 理 由 農地の改修，農薬の使用

そ の 他



大子町 (内山)

クロモ

Hydrilla verticillata (L.f.) Rich.

トチカガミ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／東南アジア・オーストラリア・マダガスカル・ヨーロッパ

生 育 地 沼や流水中に生える。湖沼などに生育が確認されていたが，現在は生育地が少なくなっている。

選 定 理 由 湖岸の埋立，溜池の埋立，水質の汚濁

そ の 他



土浦市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

トチカガミ

Hydrocharis dubia (Blume) Backer

トチカガミ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／東南アジア・オーストラリア

生 育 地 池や溝の生える。涸沼、霞ヶ浦などに生育する。

選 定 理 由 溜池の埋立

そ の 他



土浦市 (内山)

コウガイモ

Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino

トチカガミ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州／中国 (中部)

生 育 地 池や小川に生える。湖沼などに生育が確認されていたが、現在は生育地が少なくなっている。

選 定 理 由 河川の改修、水質の汚濁

そ の 他



東海村 (内山)

セキショウモ

Vallisneria natans (Lour.) H.Hara

トチカガミ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／アジア・オーストラリア

生 育 地 池や小川に生える。湖沼などに生育が確認されていたが、現在は生育地が少なくなっている。

選 定 理 由 河川の改修、水質の汚濁

そ の 他



(県博収蔵標本：筑西市産)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

オオササエビモ

Potamogeton anguillanus Koidz.

ヒルムシロ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州

生 育 地 池や流水中に生える。霞ヶ浦や神栖市に生育する。

選 定 理 由 湖岸の埋立

そ の 他



行方市（内山）

イトモ

Potamogeton berchtoldii Fieber

ヒルムシロ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 北海道・本州・四国・九州／世界の温帯・熱帯

生 育 地 池や流水中に生える。湖沼などに生育が確認されていたが、現在は生育地が少なくなっている。

選 定 理 由 河川の改修，湖岸の埋立

そ の 他



大子町（内山）

ササバモ

Potamogeton wrightii Morong

ヒルムシロ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・東南アジア

生 育 地 流水中に生えることが多い。湖沼などに生育が確認されていたが、現在は生育地が少なくなっている。

選 定 理 由 河川の改修，湖岸の埋立

そ の 他



潮来市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ノギラン

Aletris luteoviridis (Maxim.) Franch.

ユリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 南千島・北海道・本州・四国・九州

生 育 地 山地に生える。北茨城市，高萩市，大子町，日立市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

アマナ

Amana edulis (Miq.) Honda

ユリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（福島県以南・石川県以西）・四国・九州・奄美大島／朝鮮・中国（東北）

生 育 地 山地の原野や路傍などに生える。県北や県西地域に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常総市（内山）

キジカクシ

Asparagus schoberioides Kunth

ユリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国・樺太・ダブリア・ウスリー・シベリア東部

生 育 地 山地の草原に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採，草地の開発

そ の 他



大子町（内山）

スズラン

Convallaria majalis L. var. *manshurica* Kom.

ユリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州／朝鮮・中国・シベリア
東部

生 育 地 山地の草地に生える。県北や県央地域に生育
する。

選 定 理 由 森林の伐採，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市（内山）

ヒメマイヅルソウ

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt

ユリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州（中部以北）／朝鮮・中国・樺太・
カムチャツカ・シベリア

生 育 地 山地の針葉樹林下などに生える。八溝山，三
鈷室山に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

ヒオウギ

Belamcanda chinensis (L.) DC.

アヤメ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮・中国・イン
ド

生 育 地 山地の草原に生える。大子町，男体山，常陸
大宮市，西金砂山などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶
滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

カキツバタ

Iris laevigata Fisch.

アヤメ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	危急種
環境省2012	準絶滅危惧 (NT)
分 布	北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国 (東北) シベリア東部
生 育 地	水湿地に生える。水戸市, 笠間市, 茨城町など に生育する。
選 定 理 由	湿地の開発, 遷移の進行
そ の 他	



水戸市 (内山)

アヤメ

Iris sanguinea Hornem.

アヤメ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	
環境省2012	
分 布	北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国 (東北) シベリア東部
生 育 地	山地のやや乾いた草原に生える。北茨城市, 常陸大宮市, 水戸市, 笠間市などに生育する。
選 定 理 由	草地の開発, 遷移の進行
そ の 他	



北茨城市 (内山)

ハイチゴザサ

Isachne nipponensis Ohwi

イネ科

茨城県2012	絶滅危惧Ⅱ類
茨城県1997	
環境省2012	
分 布	本州 (関東以西)・四国・九州／朝鮮南部
生 育 地	湿地に生える。筑波山, 笠間市, 御前山に 生育する。
選 定 理 由	森林の伐採
そ の 他	



御前山 (内山)

ヤマトミクリ

Sparganium fallax Graebn.

ミクリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (関東以西)・九州/ビルマ・インド

生 育 地 浅い水中に生える。桜川市, 笠間市などに生育する。

選 定 理 由 溜池の埋立

そ の 他



桜川市 (内山)

ナガエミクリ

Sparganium japonicum Rothert

ミクリ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国・九州/朝鮮

生 育 地 浅い水中に生える。常陸太田市, 東海村, 水戸市などに生育する。

選 定 理 由 河川の改修, 溜池の埋立

そ の 他



ひたちなか市 (内山)

イトテンツキ

Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. *capitata* (Miq.) Ohwi

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (中部)・四国・九州・琉球/インドネシア

生 育 地 日当たりのよい草地に生える。筑西市, 神栖市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発, 遷移の進行

そ の 他



つくば市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヒメスゲ

Carex oxyandra (Franch. et Sav.) Kudo

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／樺太・千島・台湾

生 育 地 山地または高山の林地や草地に生える。北茨城市に生育する。

選 定 理 由 生育地点が少ない，草地の開発，遷移の進行

そ の 他



北茨城市（内山）

シオクグ

Carex scabrifolia Steud.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州・琉球／朝鮮・中国

生 育 地 海岸の塩水の出入りする泥地に生える。日立市や神栖市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



水戸市（内山）

コツブヌマハリイ

Eleocharis parvinux Ohwi

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

分 布 本州（関東）〔日本固有種〕

生 育 地 平地の沼や川岸の湿地に生える。古河市，常総市，つくばみらい市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常総市（内山）

オオイヌノハナヒゲ

Rhynchospora fauriei Franch.

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・ロシア東部

生 育 地 湿地に生える。水戸市，小美玉市，笠間市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



小美玉市（内山）

タタラカンガレイ

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla var. *tataranus* (Honda) K.Kohno, Iokawa et Daigobo

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東）・九州

生 育 地 湿地に生える。稲敷市などに生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



（県博収蔵標本：稲敷市産）

シズイ

Schoenoplectus nipponicus (Makino) Sojak

カヤツリグサ科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／中国（東北）

生 育 地 池沼などの浅水中に生える。高萩市や水戸市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



北茨城市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

マメツタラン

Bulbophyllum drymoglossum Maxim. ex Okubo

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (関東以西)・四国・九州・琉球／朝鮮南部・中国・台湾

生 育 地 山地の樹幹または岩石の上に着生する。男体山, 常陸大宮市, 常陸太田市, 城里町などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市 (内山)

ムギラン

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (関東以西)・四国・九州

生 育 地 常緑樹林内の樹上や岩上などに着生する。男体山, 常陸太田市, 常陸大宮市, 筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市 (内山)

エビネ

Calanthe discolor Lindl.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 北海道 (西南部)・本州・四国・九州・琉球／朝鮮 (濟州島)

生 育 地 林下などに生える。県内各地に生育していたが, 乱獲などにより減少した。

選 定 理 由 園芸採取, 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市 (内山)

ユウシュンラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. *subaphylla* (Miyabe et Kudo) Ohwi

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 北海道・本州・四国・九州

生 育 地 山地林下に生える。男体山，西金砂山，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



鷲子山 (丸山)

クゲヌマラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. *shizuoi* (F.Maek.) Ohwi

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州 (宮城県～和歌山県)・四国 (小豆島)

生 育 地 海岸の砂質のクロマツ林に生える。北茨城市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 本県の生育地は山地部の落葉樹林下である。



北茨城市 (中崎)

マヤラン

Cymbidium macrorhizon Lindl.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州 (関東南部以西)・四国・九州・琉球

生 育 地 常緑広葉樹林下などに生える。日立市，ひたちなか市，土浦市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



ひたちなか市 (内山)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

セッコク

Dendrobium moniliforme (L.) Sw.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 絶滅危惧種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／朝鮮南部・中国・台湾

生 育 地 山地の常緑樹林内の樹上や岩上などに着生する。県内の山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採，園芸採取

そ の 他



常陸太田市（内山）

カキラン

Epipactis thunbergii A.Gray

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国（東北）・ウスリー

生 育 地 日当たりのよい湿地に生える。県内各地に生育するが，環境の変化などにより産地は減少している。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



高萩市（内山）

ムカゴソウ

Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012 絶滅危惧ⅠB類（EN）

分 布 北海道（南部）・本州・四国・九州・琉球／中国（東北）・台湾

生 育 地 やや湿った草地に生える。八溝山，ひたちなか市，筑波山などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



筑波山（小池）

コフタバラン

Listera cordata (L.) R.Br. var. *japonica* H.Hara

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州中北部・四国／千島・樺太

生 育 地 亜高山帯の針葉樹林下に生える。北茨城市、高萩市、三鈷室山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

ツレサギソウ

Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道（西南部）・本州・四国・九州・琉球／中国

生 育 地 日当たりのよい草地や湿った林下に生える。高萩市、大子町、常陸太田市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採、草地の開発、遷移の進行

そ の 他



西金砂山（内山）

ハクウンラン

Vexillabium nakaianum F.Maek.

ラン科

茨城県2012 絶滅危惧Ⅱ類

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州・九州／朝鮮

生 育 地 山地の樹林下に生える。北茨城市、三鈷室山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種