

感染性胃腸炎の集団発生について

県内の下記の2施設において、感染性胃腸炎を疑う嘔吐・下痢・発熱の発症者が30名以上の集団発生がありました。入院者・重症者はおらず、患者は全員快方に向かっています。

類似施設の管理者や従事者におかれましては、施設内における適切な消毒の実施、嘔吐物等の処理方法の再確認をお願いいたします。

手洗いは、手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。県民の皆様には、帰宅時・食事の前・トイレの後の手洗いを励行し、感染予防に努めていただきますようお願いいたします。

記

1 ひたちなか保健所管内 サービス付き高齢者向け住宅

○主な症状 嘔吐、下痢、発熱

○発症状況 2月6日から2月13日までに入所者27名(60歳代、80歳～100歳代)、職員14名(20歳代～80歳代)が嘔吐、下痢、発熱の症状を呈している。

○検査結果 患者8名の検体(便)を検査したところ、7名の検体からノロウイルスが検出。

○発症者の年代別内訳

入所者	区分	60歳代	80歳代	90歳代	100歳代	計			
	男性	1	3	4	0	8			
	女性	0	10	7	2	19			
計		1	13	11	2	27			
職員	区分	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	計
	男性	0	1	0	1	0	0	1	3
	女性	1	1	2	2	4	1	0	11
	計	1	2	2	3	4	1	1	14

2 竜ヶ崎保健所管内 有料老人ホーム

○主な症状 嘔吐、下痢、発熱

○発症状況 2月5日から2月13日までに入所者29名(70歳代～100歳代)、職員13名(10歳代、20歳代、40歳代～60歳代)が嘔吐、下痢、発熱の症状を呈している。

○検査結果 患者5名の検体(便)を検査したところ、5名の検体からノロウイルスが検出。

○発症者の年代別内訳


入所者	区分	70歳代	80歳代	90歳代	100歳代	計	
	男性	0	4	3	1	8	
	女性	1	7	10	3	21	
計		1	11	13	4	29	
職員	区分	10歳代	20歳代	40歳代	50歳代	60歳代	計
	男性	1	3	2	0	0	6
	女性	1	3	1	1	1	7
	計	2	6	3	1	1	13

施設及び患者等の個人情報については、プライバシー保護の観点から特定されることのないよう、格段の御配慮をお願いいたします。

感染症発生動向調査による感染性胃腸炎の流行状況は、以下のとおりです。

2024年第5週(2024年1月29日～2024年2月4日)の定点あたり患者報告数:茨城県 6.73

感染症発生動向調査（定点当たりの患者報告数の推移）



◆値は速報値です。今後数値に若干の変更が生じる場合があります。

<参考>

◎茨城県内の感染性胃腸炎の集団発生状況

年	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
茨城県	17件	49件	9件	6件	6件	4件	9件	7件	10件	5件

(注1) 集団発生状況は、医療機関・学校・社会福祉施設等において30名以上発生した件数を計上。

(注2) 2024年の発生数は、今回の発生を含んでいます。

※感染症発生動向調査(定点当たりの患者報告数の推移)

感染性胃腸炎は定点把握疾患であり、県が指定した県内75か所の小児科を標榜する医療機関を定点として指定し、その定点の医師から1週間に感染性胃腸炎と診断された患者数を保健所に報告いただいている。その患者数の総数を定点数(75)で除した数字で流行状況を把握している。(感染性胃腸炎 警報発令基準:20 警報解除基準:12)

感染性胃腸炎に注意しましょう

- 感染性胃腸炎とは、ウイルスや細菌などが原因となって引き起こされる胃腸炎の総称です。感染性胃腸炎のなかで、もっとも多いのがウイルス性胃腸炎で、原因となるウイルスは「ノロウイルス」、「ロタウイルス」などがあります。
- 「ノロウイルス」による感染症や食中毒は一年を通じて発生していますが、例年冬になると発生のピークを迎えます。「ノロウイルス」は、少量でも感染力がとても強いことが特徴です。

症 状

ノロウイルスに感染すると 24～48 時間の潜伏期間を経て、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状がみられます。通常、これらの症状が 1～2 日続いた後、治癒し、後遺症もありません。

主な感染経路

ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、経口感染が主な感染経路とされています。主に次のような感染が考えられます。

- 患者の便や嘔吐物などに触れた手から口に入る場合。
- 感染した人の調理や配膳などにより汚染された食品を食べた場合。
- 汚染されていた食品を、生あるいは加熱不十分で食べた場合。
- 家庭や共同生活施設など人同士が接触する機会が多いところで、人から人へ直接感染する場合。
- 感染した人の便や嘔吐物が乾燥して、細かな塵として舞い上がり、その塵と一緒にウイルスを吸い込んだ場合。



感染予防のポイント

- ① 基本的な予防方法は手洗いです。特に、排せつした後、調理や食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
- ② 食品は十分に加熱調理しましょう。食品の中心部で 85℃以上 90 秒間以上の加熱が必要です。
- ③ 感染を広げないための注意点
 - ・ 便や嘔吐物の処理の後、排せつした後、調理や食事の前には必ず石けんと流水で丁寧に手を洗い、手洗い後は、ペーパータオルか個人用のタオルを使用しましょう。
 - ・ 患者の便や嘔吐物を処理する場合は、使い捨て手袋、マスク、エプロンを着用し、適切な方法（リーフレット参照）で処理しましょう。「ノロウイルス」に効果がある消毒薬は、次亜塩素酸ナトリウムです。

感染性胃腸炎かなと思ったら

乳幼児や高齢者では下痢等による脱水症状を生じることがありますので、早めに医療機関を受診することが大切です。嘔吐の症状がおさまったら少しずつ水分を補給し、安静に努め、回復期には消化しやすい食事をとるよう心がけましょう。

◎ 感染性胃腸炎に関する詳細情報は、下記のホームページをご覧ください。

- ◆ リーフレット「ノロウイルスに注意！！」 茨城県感染症情報センター ホームページ
<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/other/documents/noro-leaf.pdf>
- ◆ 「ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒の予防について」 厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/about_norovirus_qa.html